PL Profesjonalny żel do wybielania zębów

Zawiera 16% nadtlenku mocznika (uwalniającego ok. 5.8% nadtlenku wodoru).
Zawiera azotan potasu i fluorek sodu.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Flavouring, Disodium EDTA.

PRZEZNACZENIE
Żel wybielający do zębów w postaci preparatu zawierającego 16% nadtlenku mocznika jest przeznaczony do nakładkowego wybielania zębów w gabinecie stomatologicznym. Produkt może zostać przekazany pacjentowi do dalszego stosowania w warunkach domowych zgodnie z zaleceniami lekarza-dentysty. Produkt stosuje się w celu redukcji przebarwień zębów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, w tym przebarwień związanych z wiekiem. Produkt jest przeznaczony do stosowania u dorosłych pacjentów posiadających uzębienie.

SPOSÓB UŻYCIA
Sposób aplikacji: nakładki indywidualne lub uniwersalne termokuczliwe.
Należy usunąć kamień nazębny i przebarwienia ewentualnie. Jeśli dozło do urazu tkanek, przed rozpoczęciem wybielania należy odczekać od jednego do dwóch tygodni, aby organizcyć ryzyko nadwrażliwości dziąseł.
Czas jednej aplikacji: 4-6 godzin raz na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty.
1. Dokładnie oczyścić zęby przed aplikacją.
2. Zdjąć nasadkę ze strzykawki z zeton wybielającym.
3. Nałożyć niewielką kropkę żelu do każdej komory nakładki odpowiadającej zębom poddawanym wybieleniu.
4. Ilość żelu należy dobrać tak, aby do każdej komory nakładki odpowiadającej wybielanym zębom nałożyć niewielką kropkę preparatu. Po aplikacji dokładnie zamknąć strzykawkę. Jedna strzykawka, zawierająca 1,2 ml produktu, wystarcza na około dwie trzy aplikacje. Na jedną aplikację należy zużyć około 1/3-1/2 zawartości strzykawki, co jest ilością wystarczającą do zastosowania zarówno w nakładce górnej, jak i dolnej.
5. Założyć nakładkę na zęby, tak aby żel dokładnie przylegał do powierzchni zębów.
6. Usunąć nadmiar żelu z dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej za pomocą chusteczki higienicznej lub suchej, miękkiej szczoteczki.
7. Po zakończeniu zabiegu zdjąć nakładkę, a następnie dokładnie opłukać nakładkę oraz jamę ustną letnią wodą.
8. Umyć zęby.
Stosować raz na dobę, chyba że lekarz dentysty zalecił inaczej. Nie przekraczać zalecanego czasu ani ilości preparatu.
W przypadku wystąpienia bagodnej nadwrażliwości skrócić czas aplikacji lub zrobić przerwę w stosowaniu żelu (1–2 dni).
W przypadku utrzymującego się dyskomfortu lub podrażnienia – przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem dentystą.
Zalecany czas kuracji: około 10 dni lub do uzyskania pożądanego efektu wybielania, zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty.

ZABY UŻYSKAĆ SKUTECZNE REZULTATY:
Nie należy jeść, pić ani palić podczas zabiegu.
Nie należy palić bezpośrednio po zabiegu – należy odczekać co najmniej dwie godziny.
Przez co najmniej 48 godzin po zabiegu należy unikać spożywania napojów o intensywnych barwach.

Po zakończeniu wybielania należy odczekać 7–10 dni przed doborem koloru i wykonaniem uzupełnień adhezyjnych z materiałów kompozytowych. Stabilizacja koloru wymaga czasu, z pozostałości jonów nadtlenkowych może obniżać się wiązania. Jest to szczególnie ważne przed wykonaniem odbudowy uzupełnień metodą bezpośrednią.
W celach przypadkach żęby nie reagują na wybielanie. Zdarza się również, że pierwotny kolor zębów powraca wkrótce po zakończeniu leczenia.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku:
- Alergii lub nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu
- Chorób dziąseł lub stanów zapalnych jamy ustnej
- Nieleczonej próchnicy lub uszkodzeń zębów
- Ciąży i karmienia piersią (bez konsultacji z lekarzem)
- U osób poniżej 18 roku życia

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Do stosowania pod nadzorem lekarza dentysty.
Zawiera 16% nadtlenku mocznika (uwalniającego około 5,8% nadtlenku wodoru).
Zawiera nadtlenek wodoru.
Zawiera fluorek sodu.
Wyrób przeznaczony do sprzedaży wyłącznie lekarzom dentystom. W każdym cyklu stosowania pierwsze użycie musi być przeprowadzone przez lekarza dentystę lub pod jego bezpośrednim nadzorem, jeżeli pacjent nie posiada wcześniej doświadczenia. Następnie produkt może zostać przekazany konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania.
Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Unikać kontaktu z dziąsłami i tkankami miękkimi. Po nałożeniu nakładki z preparatem, usunąć nadmiar żelu z dziąseł.
Nie połykać produktu.
Przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia bólu, podrażnienia lub nadwrażliwości.
Produkt wybiela wyłącznie naturalne tkanki zęba. Nie zmienia koloru wypełnień kompozytowych, koron, licówek ani innych uzupełnień protetycznych.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
- Nadwrażliwość zębów
- Podrażnienia dziąseł
- Przejściowy dyskomfort

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze 2-25 °C.
Chronić przed światłem.
Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowanie należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2026/1

EN Professional teeth whitening gel

Contains 16% urea peroxide (which releases approximately 5.8% hydrogen peroxide).
Contains potassium nitrate and sodium fluoride.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENTS: Glycerine, Water, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENTS: Glycerine, Water, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Flavouring, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENTS: Glycerine, Water, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Flavouring, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENTS: Glycerine, Water, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Flavouring, Disodium EDTA.

INTENDED USE
This teeth whitening gel, containing 16% urea peroxide, is intended for tray-based teeth whitening in a dental clinic. The product can be handed over to the patient for continued use at home in accordance with the dentist's instructions. The product is used to reduce tooth discolouration, both external and internal, including age-related discolouration. The product is intended for use in adult patients with natural teeth.

INSTRUCTIONS FOR USE
Method of application: custom-made or universal heat-shrink trays.
Tartar and surface stains should be removed. If there has been any injury to the tissues, wait one to two weeks before starting the whitening treatment to minimise the risk of gum hypersensitivity.
Duration of a single application: 4-6 hours once a day, as recommended by your dentist.
1. Clean your teeth thoroughly before application.
2. Remove the cap from the syringe containing the whitening gel.
3. Apply a small drop of gel to each reservoir of the tray corresponding to the teeth being whitened.
4. The amount of gel should be adjusted so that a small drop of the product is applied to each reservoir of the tray corresponding to the teeth being whitened. After application, close the syringe securely. One syringe, containing 1.2 ml of the product, is sufficient for approximately two to three applications. For each application, use approximately 1/3 to 1/2 of the syringe's contents, which is sufficient for application to both the upper and lower tray.
5. Place the tray in the mouth so that the gel adheres closely to the surfaces of the teeth.
6. Remove any excess from the gums and the mucous membrane of the oral cavity using a tissue or a dry, soft toothbrush.
7. Once the treatment is complete, remove the tray, then rinse the tray and oral cavity thoroughly with lukewarm water.
8. Brush your teeth.
Use once a day, unless your dentist advises otherwise. Do not exceed the recommended duration or dosage.
If mild discomfort occurs, reduce the duration of application or temporarily stop using the gel (1–2 days).
If discomfort or irritation persists, permanently discontinue the product and contact your dentist.
Recommended duration of treatment: approximately 10 days or until the desired whitening effect is achieved, as advised by your dentist.

FOR BEST RESULTS:
Do not eat, drink or smoke during the procedure.
Do not smoke immediately after the procedure – wait at least two hours.
For at least 48 hours after the procedure, avoid foods and drinks with strong colours.

Once the bleaching treatment is complete, wait 7–10 days before selecting a shade and carrying out adhesive restorations using composite materials. Colour stabilisation can take time, and residual peroxide ions may reduce bond strength. This is particularly important before fitting the final tooth-coloured restorations.
In rare cases, teeth do not respond to whitening. It also happens that the teeth's original colour returns shortly after treatment has finished.

CONTRAINDICATIONS
Do not use in the following cases:
- Allergy or hypersensitivity to any of the ingredients
- Gum disease or oral cavity inflammation
- Untreated caries or damaged enamel
- Pregnancy and breastfeeding (without consulting a doctor)
- For people under the age of 18

PRECAUTIONS
For use under the supervision of a dentist.
Contains 16% urea peroxide (which releases approximately 5.8% hydrogen peroxide).
Contains sodium hydrogen peroxide.
Contains sodium fluoride.
This product is intended for sale to dentists only. In each treatment cycle, the first application must be carried out by a dentist or under their direct supervision, provided that an equivalent level of safety is ensured. The product can then be handed over to the consumer to complete the course of treatment.
Avoid contact with the eyes. In the event of contact with the eyes, rinse immediately with plenty of water.
Avoid contact with the gums and soft tissues. After applying the cap containing the product, remove any excess gel from the gums.
Do not ingest.
Discontinue use if pain, irritation or sensitivity occurs.
This product whitens only the natural tooth tissue. It does not alter the colour of composite fillings, crowns, veneers or other prosthetic restorations.

POSSIBLE SIDE EFFECTS
- Tooth hypersensitivity
- Gum irritation
- Temporary discomfort

STORAGE
Store at 2-25°C.
Protect from light.
Do not freeze.
Keep out of the reach of children.

HANDLING PRODUCT PACKAGING
Dispose of the used packaging or return it to the manufacturer.

Last update: 11.08.2026/1

ES Gel profesional para blanquear los dientes

Contiene un 16 % de peróxido de urea (que libera aprox. un 5,8 % de peróxido de hidrógeno).
Contiene nitrato de potasio y fluoruro de sodio.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENTES: Glicerina, Agua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENTES: Glicerina, Agua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENTES: Glicerina, Agua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENTES: Glicerina, Agua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

USO PREVISTO
El gel blanqueador dental, en forma de preparado que contiene un 16 % de peróxido de urea, está indicado para el blanqueamiento dental con férulas en la consulta del dentista. El producto puede entregarse al paciente para que continúe utilizándolo en su domicilio, siguiendo las indicaciones del odontólogo. Este producto se utiliza para reducir las manchas dentales, tanto externas como internas, incluidas las relacionadas con la edad. Este producto está indicado para su uso en pacientes adultos con dentición natural.

MODO DE USO
Modo de aplicación: férulas individuales o férulas termoplásticas universales.
Es necesario eliminar el sarro y las manchas externas. Si se ha producido una lesión tisular, espere entre una y dos semanas antes de iniciar el blanqueamiento para reducir el riesgo de hipersensibilidad gingival.
Duración de una aplicación: de 4 a 6 horas una vez al día, según las indicaciones del dentista.
1. Limpiar bien los dientes antes de la aplicación.
2. Retirar el tapón de la jeringa de gel blanqueador.
3. Aplicar una pequeña gota de gel en cada compartimento de la férula correspondiente a los dientes que se van a blanquear.
4. La cantidad de gel debe ajustarse de manera que se aplique una pequeña gota del producto en cada compartimento de la férula correspondiente a los dientes que se van a blanquear. Después de la aplicación, cerrar bien la jeringa. Una jeringa, cha arriba, que contiene 1,2 ml de producto, es suficiente para una dos o tres aplicaciones. Para cada aplicación debe utilizarse aproximadamente entre 1/3 y 1/2 del contenido de la jeringa, cantidad suficiente para su aplicación tanto en la férula superior como en la inferior.
5. Colocar la férula sobre los dientes de modo que el gel se adhiera perfectamente a su superficie.
6. Retirar el exceso de gel de las encías y de la mucosa oral con un pañuelo de papel o un cepillo de dientes seco y suave.
7. Una vez finalizado el tratamiento, retirar la férula y, a continuación, enjuagar bien la férula y la cavidad oral con agua tibia.
8. Lavarse los dientes.
Utilizar una vez al día, salvo que el dentista indique lo contrario. No se debe superar la duración ni la dosis recomendadas.
En caso de molestias o irritación persistentes, interrumpir el uso y consultar al odontólogo.
Duración recomendada del tratamiento: unos 10 días o hasta conseguir el efecto de blanqueamiento deseado, según las indicaciones del dentista.

PARA OBTENER RESULTADOS EFICACES:
No se debe comer, beber ni fumar durante el tratamiento.
No se debe fumar inmediatamente después del tratamiento; hay que esperar al menos dos horas.
Durante al menos 48 horas después del tratamiento, se deben evitar los alimentos y bebidas de colores intensos.

Una vez finalizado el blanqueamiento, hay que esperar entre 7 y 10 días antes de elegir el color y realizar las restauraciones adhesivas con materiales compuestos. La estabilización del color requiere tiempo y los iones de peróxido residuales pueden reducir la fuerza de adhesión. Esto es especialmente importante antes de realizar restauraciones definitivas del color del diente.
En casos excepcionales, los dientes no responden al blanqueamiento. También ocurre que el color original de los dientes vuelve a aparecer poco después de finalizar el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES
No utilizar en los siguientes casos:
- Alergia o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto
- Enfermedades de las encías o inflamaciones de la cavidad oral
- Caries no tratada o esmalte dañado
- Embarazo y lactancia (sin consultar al médico)
- En personas menores de 18 años

PRECAUCIONES
Para uso bajo la supervisión de un odontólogo.
Contiene un 16 % de peróxido de urea (que libera aprox. un 5,8 % de peróxido de hidrógeno).
Contiene peroxosulfato de sodio.
Contiene fluoruro de sodio.
Este producto está destinado a la venta exclusiva a odontólogos. En cada ciclo de uso, la primera aplicación debe ser realizada por un odontólogo o bajo su supervisión directa, siempre que se garantice un nivel de seguridad equivalente. A continuación, el producto puede entregarse al consumidor para que complete el ciclo de uso.
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua.
Evitar el contacto con las encías y los tejidos blandos. Después de colocar la férula con el producto, retirar el exceso de gel de las encías.
No ingerir el producto.
Suspenda su uso si se produce dolor, irritación o hipersensibilidad.
Este producto blanquea únicamente los tejidos naturales del diente. No altera el color de los empastes de composite, las coronas, las carillas ni otras restauraciones protésicas.

POSIBLES REACCIONES ADVERSAS
- Hipersensibilidad dentaria
- Irritación de las encías
- Molestias pasajeras

ALMACENAMIENTO
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 25 °C.
Proteger de la luz.
No congelar.
Mantener fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO
Los envases usados deben eliminarse o devolverse al fabricante.

Fecha de la última revisión: 11.08.2026/1

FR Gel professionnel pour le blanchiment des dents

Contient 16 % de peroxyde de carbamide (libérant environ 5,8 % de peroxyde d'hydrogène).
Contient du nitrate de potassium et du fluorure de sodium.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

UTILISATION PRÉVUE
Ce produit est un gel blanchissant dentaire contenant 16 % de peroxyde de carbamide, destiné à être utilisé en blanchiment des dents à l'aide de gouttières au cabinet dentaire. Le produit peut être remis au patient afin qu'il puisse continuer à l'utiliser à domicile, conformément aux recommandations du dentiste. Le produit est utilisé pour réduire les colorations des dents, tant extrinsèques qu'intrinsèques, notamment celles liées à l'âge. Ce produit est destiné à être utilisé chez les patients adultes ayant une dentition naturelle.

MODE D'EMPLOI
Mode d'application : gouttières sur mesure ou universelles thermomoulables.
Il faut éliminer le tartre dentaire et les colorations extrinsèques. En cas de traumatisme des tissus, il convient d'attendre une à deux semaines avant de commencer le blanchiment afin de réduire le risque d'hypersensibilité gingivale.
Durée d'une application : 4 à 6 heures une fois par jour, conformément aux recommandations du dentiste.
1. Nettoyez soigneusement les dents avant l'application.
2. Retirer le capuchon de la seringue contenant le gel blanchissant.
3. Déposer une petite goutte de gel dans chaque compartiment de la gouttière correspondant aux dents à blanchir.
4. La quantité de gel doit être adaptée de manière à déposer une petite goutte de produit dans chaque compartiment de la gouttière correspondant aux dents à blanchir. Après l'application, bien refermer la seringue. Une seringue contenant 1,2 ml de produit suffit pour environ deux à trois applications. Pour chaque application, utiliser environ 1/3 à 1/2 du contenu de la seringue, ce qui correspond à une quantité suffisante pour les gouttières supérieure et inférieure.
5. Placer la gouttière sur les dents de manière à ce que le gel adhère parfaitement à leur surface.
6. Éliminer l'excédent de gel présent sur les gencives et la muqueuse buccale à l'aide d'un mouchoir en papier ou d'une brosse à dents souple et sèche.
7. Après le traitement, retirer la gouttière, puis rincer soigneusement la gouttière ainsi que la bouche à l'eau tiède.
8. Se brosser les dents.
Utiliser une fois par jour, sauf indication contraire du dentiste. Ne pas dépasser la durée ni la quantité de produit recommandées.
En cas d'hypersensibilité légère, réduire la durée d'application ou interrompre l'utilisation du gel pendant 1 à 2 jours.
En cas de gêne ou d'irritation persistante, interrompre l'utilisation du produit et consulter un dentiste.
Durée de traitement recommandée : environ 10 jours ou jusqu'à l'obtention du résultat de blanchiment souhaité, conformément aux recommandations du dentiste.

POUR OBTENIR DES RÉSULTATS EFFICACES :
Ne pas manger, boire ni fumer pendant le traitement.
Ne pas fumer immédiatement après le traitement – attendre au moins deux heures.
Pendant au moins 48 heures après le traitement, éviter les aliments et les boissons fortement colorés.

Après le blanchiment, attendre 7 à 10 jours avant de choisir la teinte et de réaliser des restaurations adhésives en matériaux composites. La stabilisation de la teinte nécessite du temps, et les résidus d'ions peroxydes peuvent réduire la force d'adhésion. Cela est particulièrement important avant la réalisation de restaurations définitives de la couleur des dents.
Dans de rares cas, les dents ne réagissent pas au blanchiment. Il peut également arriver que la teinte initiale des dents réapparaisse peu après la fin du traitement.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser dans les cas suivants :
- Allergie ou hypersensibilité à l'un des composants du produit
- Maladies des gencives ou inflammations de la cavité buccale
- Caries non traitées ou émail endommagé
- Grossesse et allaitement (sans consultation médicale)
- Chez les personnes de moins de 18 ans

PRÉCAUTIONS
À utiliser sous la surveillance d'un dentiste.
Contient 16 % de peroxyde de carbamide (libérant environ 5,8 % de peroxyde d'hydrogène).
Contient du peroxyde d'hydrogène.
Contient du fluorure de sodium.
Produit destiné à la vente exclusivement aux dentistes. Lors de chaque cycle d'utilisation, la première application doit être effectuée par un dentiste ou sous sa supervision directe, à condition qu'un niveau de sécurité équivalent soit assuré. Le produit peut ensuite être remis au consommateur afin qu'il termine le cycle d'utilisation.
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Éviter tout contact avec les gencives et les tissus mous. Après avoir appliqué la gouttière contenant le produit, éliminer l'excédent de gel présent sur les gencives.
Ne pas avaler le produit.
Interrompre l'utilisation en cas de douleur, d'irritation ou d'hypersensibilité.
Le produit blanchit uniquement les tissus dentaires naturels. Il ne modifie pas la teinte des obturations en composite, des couronnes, des facettes ni des autres restaurations prothétiques.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
- Hypersensibilité dentaire
- Irritations des gencives
- Gêne transitoire

CONSERVATION
Conserver à une température comprise entre 2 et 25 °C
Protéger de la lumière.
Ne pas congeler.
Tenir hors de portée des enfants.

TRAITEMENT DES EMBALLAGES DU PRODUIT
Les emballages usagés doivent être éliminés ou retournés au fabricant.

Date de dernière mise à jour: 11.08.2026/1

DE Professionelles Zahnaufhellungsgel

Enthält 16 % Carbamidperoxid (setzt ca. 5,8 % Wasserstoffperoxid frei).
Enthält Kaliumnitrat und Natriumfluorid.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

ZWECKBESTIMMUNG
Das Zahnaufhellungsgel in Form eines Präparats mit 16 % Carbamidperoxid ist für die Zahnaufhellung mittels Aufhellungsschienen in der Zahnarztpraxis bestimmt. Das Produkt kann dem Patienten zur weiteren Anwendung zu Hause gemäß den Anweisungen des Zahnarztes ausgehändigt werden. Das Produkt wird zur Reduzierung von sowohl äußerer als auch innerer Zahnverfärbungen, einschließlich altersbedingter Verfärbungen, angewendet. Das Produkt ist für die Anwendung bei erwachsenen Patienten mit natürlichen Gebissen bestimmt.

ANWENDUNG
Applikationsart: individuell angefertigte oder universelle thermoplastische Aufhellungsschienen.
Zahnstein und äußere Verfärbungen sind zu entfernen. Bei einer Verletzung des Gewebes ist vor Beginn der Zahnaufhellung ein Zeitraum von 1 bis 2 Wochen abzuwarten, um das Risiko einer Überempfindlichkeit des Zahnfleisches zu verringern.
Einwirkdauer pro Anwendung: 4–6 Stunden einmal täglich gemäß den Anweisungen des Zahnarztes.
1. Die Zähne vor der Anwendung gründlich reinigen.
2. Die Kappe von der Spritze mit dem Aufhellungsgel abnehmen.3. Einen kleinen Tropfen des Gels in jede Kammer der Aufhellungsschiene auftragen, die den aufzuhellenden Zähnen entspricht.
4. Die Gelmenge so dosieren, dass in jede Kammer der Aufhellungsschiene, die den aufzuhellenden Zähnen entspricht, ein kleiner Tropfen des Präparats eingebracht wird. Die Spritze nach der Anwendung sorgfältig verschließen. Eine Spritze mit 1,2 ml Produkt reicht für etwa 2–3 Anwendungen. Für eine Anwendung sind etwa 1/3–1/2 des Spritzeninhalts verwendet werden. Diese Menge ist sowohl für die obere als auch für die untere Aufhellungsschiene ausreichend.
5. Die Aufhellungsschiene so auf die Zähne setzen, dass das Gel eng an den Zahnoberflächen anliegt.
6. Überschüssiges Gel vom Zahnfleisch und von der Mundschleimhaut mit einem Kosmetiktuch oder einer trockenen, weichen Zahnbürste entfernen.
7. Nach Abschluss der Behandlung die Aufhellungsschiene herausnehmen und anschließend die Schiene sowie die Mundhöhle gründlich mit lauwarmem Wasser ausspülen.
8. Die Zähne putzen.
Einmal täglich anwenden, sofern der Zahnarzt nichts anderes verordnet. Die empfohlene Einwirkdauer und die empfohlene Produktmenge nicht überschreiten.
Bei Auftreten einer leichten Überempfindlichkeit die Einwirkdauer verkürzen oder die Anwendung des Gels für 1–2 Tage unterbrechen.
Bei anhaltendem Unwohlsein oder einer Reizung die Anwendung abbrechen und den Zahnarzt kontaktieren.
Empfohlene Behandlungsdauer: etwa 10 Tage oder bis zum Erreichen des gewünschten Aufhellungsergebnisses gemäß den Anweisungen des Zahnarztes.

FÜR EIN WIRKSAMES ERGEBNIS:
Während der Behandlung nicht essen, trinken oder rauchen.
Unmittelbar nach der Behandlung nicht rauchen – mindestens 2 Stunden abwarten.
Mindestens 48 Stunden nach der Behandlung auf farbintensive Speisen und Getränke verzichten.

Nach Abschluss der Zahnaufhellung 7–10 Tage abwarten, bevor die Farbbestimmung und die Anfertigung adhäsiver Restaurationen aus Komposit-Materialien erfolgt. Die Farbstabilisierung benötigt Zeit; verbleibende Peroxidionen können die Haftfestigkeit beeinträchtigen. Dies ist insbesondere vor der Anfertigung endgültiger Zahnfarbrestaurationen von Bedeutung.
In seltenen Fällen sprechen die Zähne nicht auf eine Zahnaufhellung an. Es kann auch vorkommen, dass die ursprüngliche Zahnfarbe kurz nach Abschluss der Behandlung zurückkehrt.

GEGENANZEIGEN
Nicht anwenden bei:
- Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts
- Zahnfleischerkrankungen oder Entzündungen der Mundhöhle
- Unbehandelten Karies oder beschädigtem Zahnschmelz
- Schwangerschaft und Stillzeit (ohne Rücksprache mit einem Arzt)
- Personen unter 18 Jahren

VORSICHTSMASSNAHMEN
Zur Anwendung unter zahnärztlicher Aufsicht.
Enthält 16 % Carbamidperoxid (setzt ca. 5,8 % Wasserstoffperoxid frei).
Enthält Wasserstoffperoxid.
Enthält Natriumfluorid.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Verkauf an Zahnärzte bestimmt. In jedem Anwendungszyklus muss die erste Anwendung von einem Zahnarzt oder unter dessen unmittelbarer Aufsicht durchgeführt werden, sofern ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Anschließend kann das Produkt an den Verbraucher weitergegeben werden, damit dieser den Anwendungszyklus abschließen kann.
Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen.
Kontakt mit dem Zahnfleisch und den Weichgeweben vermeiden. Nach dem Einsetzen der mit dem Präparat befüllten Aufhellungsschiene überschüssiges Gel vom Zahnfleisch entfernen.
Das Produkt nicht schlucken.
Bei Auftreten von Schmerzen, Reizungen oder Überempfindlichkeit die Anwendung abbrechen.
Das Produkt hellt nur zahnfarbliches natürliche Zahnsubstanz auf. Es verändert weder die Farbe von Kompositfüllungen, Kronen, Veneers noch von anderen prothetischen Versorgungen.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
- Zahnschmerzempfindlichkeit
- Zahnfleischreizungen
- Vorübergehendes Unwohlsein

AUFBEWAHRUNG
Bei 2–25 °C aufbewahren.
Vor Licht schützen.
Nicht einfrieren.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DER PRODUKTVERPACKUNGEN
Gebrauchte Verpackungen sind zu entsorgen oder an den Hersteller zurückzusenden.

Letzte Aktualisierung: 11.08.2026/1

UK Професійний гель для відбілювання зубів

Містить 16 % перекису сечовини (який виділяє приблизно 5,8 % перекису водню).
Містить нітрат калію та фторид натрію.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Гель для відбілювання зубів у формі препарату, що містить 16% перекису сечовини, призначений для відбілювання зубів у стоматологічному кабінеті за допомогою накладок у стоматологічному кабінеті. Продукт може бути переданий пацієнту для подальшого застосування в домашніх умовах відповідно до рекомендацій лікаря-стоматолога. Препарат застосовується для видалення зовнішніх і внутрішніх забарвлень зубів, зокрема забарвлення, пов'язаних із віком. Препарат призначений для застосування у дорослих пацієнтів із природними зубними рядами.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Спосіб застосування: індивідуальні або універсальні термоусадочні накладки.
Необхідно видалити зубний камінь та зовнішні забарвлення. Якщо сталося пошкодження тканин, перед початком відбілювання слід зачекати від одного до двох тижнів, щоб знизити ризик надчутливості ясен.
Тривалість одного накладення: 4–6 годин один раз на добу, відповідно до рекомендацій лікаря-стоматолога.
1. Перед нанесенням ретельно почистіть зуби.
2. Зніміть ковпачок зі шприца з гелем відбілювання.
3. Нанесіть невелику краплю гелю в кожну камеру накладки, що відповідає зубам, які підлягають відбілюванню.
4. Кількість гелю слід підбирати так, щоб у кожну камеру накладки, що відповідає зубам, які підлягають відбілюванню, була невелику крапля препарату. Після нанесення ретельно закрийте шприц. Одного шприца, що містить 1,2 мл (мл) препарату, вистачає приблизно на два-три нанесення. На одне нанесення слід витратити приблизно 1/3–1/2 вмісту шприца, чого вистачить для нанесення як на верхню, так і на нижню накладку.
5. Надягніте накладку на зуби так, щоб гель щільно прилягав до поверхні зубів.
6. Видаліть надлишок гелю з ясен та слизової оболонки ротової порожнини за допомогою гігієнічної серветки або м'якої зубної щітки.
7. Після завершення процедури зніміть накладку, а потім ретельно промийте накладку та ротову порожнину теплою водою.
8. Почистити зуби.
Застосовувати один раз на добу, якщо лікар-стоматолог не призначить інакше. Не перевищувати рекомендовану тривалість курсу лікування.
У разі виникнення легкої гіперчутливості слід скоротити час нанесення або зробити перерву у застосуванні гелю (1–2 дні).
У разі тривалого дискомфорту або подразнення — припиніть застосування та зверніться до лікаря-стоматолога.
Рекомендована тривалість курсу лікування: приблизно 10 днів або до досягнення бажаного ефекту відбілювання, згідно з рекомендаціями лікаря-стоматолога.

ЩОБ ОТРИМАТИ ЕФЕКТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
Під час процедури не слід їсти, пити та курити.
Не слід курити відразу після процедури — слід почекати щонайменше дві години.
Протягом щонайменше 48 годин після процедури слід уникати їжі та напоїв яскравих кольорів.

Після завершення відбілювання слід почекати 7–10 днів, перш ніж підбирати колір і виконувати адгезивні реставрації з композитних матеріалів. Стабілізація кольору вимагає часу, а залишки пероксидних іонів можуть знижувати міцність зв'язку. Це особливо важливо перед виконанням остаточної реставрації під колір зуба.
Відбілювання зубів не реагують на відбілювання. Також трапляється, що природний колір зубів відновлюється незабаром після завершення лікування.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не застосовувати у таких випадках:
- Алергія або підвищена чутливість до будь-якого інгредієнта продукту
- Захворювання ясен або запалення ротової порожнини
- Нелікований карієс або пошкоджена емаль
- Вагітність та період годування грудьми (без консультації з лікарем)
- У осіб молодше 18 років

ЗАСОБИ ОБЕРЕЖНОСТІ
Застосовувати під наглядом лікаря-стоматолога.
Містить 16 % перекису сечовини (який виділяє приблизно 5,8 % перекису водню).
Містить перекис водню.
Містить фторид натрію.
Препарат призначений для продажу виключно лікарям-стоматологам. У кожному циклі застосування перше використання має здійснюватися лікарем-стоматологом або під його безпосереднім наглядом, якщо забезпечується еквівалентний рівень безпеки. Після цього препарат може бути передано споживачеві для завершення курсу застосування.
Уникати потрапляння гелю в очі. У разі потрапляння в очі нег

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

ΕΠΑΛΙΔΙΑΣΗ
Ο gel λευκαίνεται σταδιακά, να forma με την πρεπαρασία con 16 % de peróxido de ureia, destina-se ao branqueamento dentário com moldeiras em consultório dentário. O produto pode ser entregue ao doente para utilização posterior em casa, de acordo com as recomendações do médico dentista. Este produto é utilizado para reduzir as descolorações dentárias, tanto externas como internas, incluindo as relacionadas com a idade. O produto destina-se a ser utilizado em doentes adultos com dentição natural.

ΜΟΔΟ DE UTILIZAÇÃO
Modo de aplicação moldeiras termoretráveis individuais ou universais.
É necessário remover o tártaro e as manchas externas. Se tiver ocorrido uma lesão nos tecidos, deve-se aguardar entre uma a duas semanas antes de iniciar o branqueamento, para reduzir o risco de hipersensibilidade das gengivas.
Duração de uma aplicação: 4 a 6 horas, uma vez por dia, de acordo com as recomendações do dentista.
1. Limpar bem os dentes antes da aplicação.
2. Retirar a seringa com o gel branqueador.
3. Aplicar uma pequena gota de gel em cada compartimento da moldeira correspondente aos dentes a branquear.
4. A quantidade de gel deve ser ajustada de forma a aplicar uma pequena gota do produto em cada compartimento da moldeira correspondente aos dentes a branquear. Após a aplicação, fechar bem a seringa. Uma seringa, contendo 2 ml, é suficiente para cerca de duas a três aplicações. Para cada aplicação, deve utilizar-se cerca de 1/3 a 1/2 do conteúdo da seringa, o que é uma quantidade suficiente para aplicar tanto na moldeira superior como na parte inferior.
5. Colocar a moldeira nos dentes, de forma a que o gel adira perfeitamente à superfície dos dentes.
6. Remover o excesso de gel das gengivas com um lenço de papel ou uma escova de dentes seca e macia.
7. Após conclusão do tratamento, retirar a moldeira e, em seguida, enxaguar bem a mesma e a cavidade oral, com água morna.
8. Lavar os dentes.
Utilizar uma vez por dia, salvo indicação em contrário do dentista. Não exceder o tempo nem a quantidade do produto recomendados.
Em caso de hipersensibilidade ligeira, reduzir o tempo de aplicação ou fazer uma pausa na utilização do gel (1 a 2 dias).
Em caso de descomfort ou irritação persistentes, interromper a utilização e consultar o dentista.
Duração recomendada do tratamento cerca de 10 dias ou até se obter o efeito de branqueamento desejado, de acordo com as recomendações do dentista.
PARA OBTER RESULTADOS EFICAZES:
Não se deve comer, beber nem fumar durante o procedimento.
Não se deve fumar imediatamente após o procedimento - deve-se esperar pelo menos duas horas.
Durante, pelo menos, 48 horas após o procedimento, deve-se evitar alimentos e bebidas com cores intensas.

Após a conclusão do branqueamento, deve-se aguardar 7 a 10 dias antes de escolher a cor e realizar as restaurações adesivas com materiais compósitos. A estabilização da cor leva tempo e os resíduos de óxido de peróxido podem reduzir a força de ligação. Isto é particularmente importante antes de se proceder às restaurações finais da cor do dente.
Em casos raros, os dentes não respondem ao branqueamento. Também acontece que a cor original dos dentes volte pouco tempo depois do fim do tratamento.

CONTRAINDICAÇÕES
Não utilizar nos seguintes casos:
- Alergia ou hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes do produto
- Doenças das gengivas ou inflamações da cavidade oral
- Cáries não tratadas ou esmalte danificado
- Restaurações dentárias (amálgama, composta medica)
- Em pessoas com menos de 18 anos

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO
Para utilização sob supervisão de um médico dentista.
Contém 16 % de peróxido de ureia (que liberta cerca de 5,8 % de peróxido de hidrogénio).
Contém peróxido de hidrogénio.
Contém fluoreto de sódio.
Produto destinado à venda exclusivamente a médicos dentistas. Em cada ciclo de utilização, a primeira utilização deve ser efetuada por um dentista ou sob a sua supervisão direta, desde que seja garantido um nível de segurança equivalente. Em seguida, o produto pode ser entregue ao consumidor para que este conclua o ciclo de utilização.
Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com água em abundância.
Evitar o contacto com as gengivas e os tecidos moles. Depois de colocar a moldeira com o produto, remover o excesso de gel das gengivas.
Não engolir o produto.
Interromper a utilização caso surja dor, irritação ou hipersensibilidade.
Este produto clareia exclusivamente os tecidos naturais do dente. Não altera a cor das obturações em compósito, coroas, facetas nem restaurações protéticas.

POSSÍVEIS EFEITOS SECUNDÁRIOS
- Hipersensibilidade dentária
- Irritação das gengivas
- Desconforto passageiro

ARMAZENAMENTO
Armazenar à temperatura de 2 a 25 °C.
Proteger da luz.
Não congelar.
Manter fora do alcance das crianças.

MANUSEAMENTO DAS EMBALAGENS DO DISPOSITIVO
As embalagens usadas devem ser descartadas ou devolvidas ao fabricante.

Data da última atualização: 11.08.2026/1

DA Professionel tandblegningsgel

Indeholder 16 % carbamidperoxid (frigiver ca. 5,8 % hydrogenperoxid).
Indeholder kaliumnitrat og natriumfluorid.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENTER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENTER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENTER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη οδοντιάτρου.
Περιέχει 16% υπεροξείδιο της ουρίας, το οποίο απελευθερώνει περίπου 5,8% υπεροξείδιο του υδρογόνου.
Περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου.
Περιέχει φθοριούχο νάτριο.
Το προϊόν προορίζεται για πώληση αποκλειστικά σε οδοντιάτρους. Σε κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται από οδοντίατρο ή υπό την άμεση επίβλεψή του, εφόσον διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. Στη συνέχεια, το προϊόν μπορεί να παραδοθεί στον καταναλωτή για την ολοκλήρωση του κύκλου χρήσης.
Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.
Αποφεύγετε την επαφή με τα ούλα και τους μαλακούς ιστούς. Αφού τοποθετήσετε τον νάρθηκα με το προϊόν, αφαιρέστε την περίσσεια του ή/και από τα ούλα.
Μην καταπίνετε το προϊόν.
Διακόψτε τη χρήση εάν εμφανίσετε πόνο, ερεθισμό ή υπερευαισθησία.
Το προϊόν λευκαίνει αποκλειστικά τους φυσικούς ιστούς των δοντιών. Δεν αλλάζει το χρώμα των σύνθετων φραγμάτων, των επιστρώσεων, των όψεων ή άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
- Υπερευαισθησία των δοντιών
- Ερεθισμός των ούλων
- Προσωρινή δυσφορία

ΦΥΛΑΞΗ
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-25°C.
Να προστατεύεται από φως.
Μην το καταψύχετε.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται ή να επιστρέφονται στον κατασκευαστή.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 11.08.2026/1

ET Professionaalne hambaste valgendamise geel

Sisaldab 16% karbamiidperoksiidi (vabastab umbes 5,8% vesinikperoksiidi).
Sisaldab kaaliumnitraati ja naatriumfluoriidi.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
KOOSTISOSAD: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
KOOSTISOSAD: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
KOOSTISOSAD: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
KOOSTISOSAD: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

KÄYTTÖTARKOITUS
Hampaiden valkaisugeeli, joka on 16 % karbamidiperoksidia sisältävä valmiste, on tarkoitettu hampaiden kiskovalkaisuun hammaslääkärissä hammaslääkärin valvonnassa. Tuote voidaan luovuttaa potilaalle kotona jälkeenvalkaisuun käyttöä varten hammaslääkärin ohjeiden mukaisesti. Tuotetta käytetään hampaiden värjäytymisen vähentämiseen, sekä ulkoisten että sisäisten, mukaan lukien ikääntymisen liittyvät värjäytymät. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla potilailla, joilla on luonnollinen hampaisto.

KÄYTTÖOHJEET
Käyttökuntoisuus yksilöllisiet tai universaalit lämpökutistuvat kiskot.
Hammaskiv ja ulkoiset värjäytymät on poistettava. Jos kudokset ovat vaurioituneet, ennen valkaisun aloittamista on odotettava yhdestä kahteen viikkoon, jotta vähennetään herkkätymisen riskin vähentämiseksi.
Yhden applikaation kesto: 4-6 tuntia kerran vuorokaudessa hammaslääkärin ohjeiden mukaisesti.
1. Puhdista hampaat huolellisesti ennen applikaatiota.
2. Poista suojakorkki valkaisugeelinsiskosta.
3. Annostele pieni pisara geeliä jokaiseen kiskon lokeroon, joka vastaa valkaistavia hampaita.
4. Geelin määrä on valittava siten, että jokaiseen valkaistavia hampaita vastaavaan kiskon lokeroon annostellaan pieni pisara valmistetta. Sulje ruisku huolellisesti applikaation jälkeen. Yksi ruisku, joka sisältää 1,2 ml tuotetta, riittää noin kahteen tai kolmeen applikaatioon. Yhtä applikaatiota varten on käytettävä noin 1/3-1/2 ruiskun sisällöstä, mikä on riittävä määrä sekä ylä- että alakiskoon.
5. Aseta kisko hampaille siten, että geeli asettuu tiiviisti hampaiden pintaa vasten.
6. Poista liika geeli ikenistä ja suun limakalvoilta hygieniapyyhkeellä tai kuivalla, pehmeällä harjalla.
7. Toimenpiteen päätyttyä poista kisko ja huuhtele sen jälkeen kisko sekä suu huolellisesti haalealla vedellä.
8. Harjaa hampaat.
Käytä kerran vuorokaudessa, ellei hammaslääkäri toisin määrää. Älä ylitä suositeltua käyttöaikaa tai valmisteen määrää.
Jos ilmenee lievää yliherkkyyttä, lyhennä applikaatioaikaa tai pidä tauko geelin käytössä (1–2 päivää).
Jos epämukavuus tai ärsytys jatkuu – lopeta käyttö ja ota yhteyttä hammaslääkäriin.

Suositeltu hoitojakson kesto: noin 10 päivää tai kunnes halutttu valkaisutulos saavutetaan, hammaslääkärin ohjeiden mukaisesti.
TEHOKKAIDEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI:
Tupakointi tai aikaan ja tuotteen käyttöä kahvia tai viiniä tulpakoida.
Välittömästi toimenpiteen jälkeen ei saa tupakoida – on odotettava vähintään kaksi tuntia.
Vähintään 48 tunnin ajan toimenpiteen jälkeen on vältettävä voimakkaavärisiä ruokia ja juomia.

Valkaisun päätyttyä on odotettava 7–10 päivää ennen värin valintaa ja komposiittimateriaaleita tehtävien adhesiivisten restauraatioiden valmistamista. Värin stabiloitumisen vaatii aikaa, ja jäljelle jäänyt peroksidi-ionit voivat heikentää sidoslujuutta. Tämä on erityisen tärkeää ennen lopullisten, hampaanväristen restauraatioiden valmistusta. Harvoissa tapauksissa hampaat eivät reagoi valkaisuun. Joskus hampaiden alkuperäinen väri myös palaa pian huolen päättymisen jälkeen.

VASTA-AIHEET
Ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:
- Allergia jollekin tuotteen jollekin aineosalle
- lensaraudat tai suun tulehdustilat
- Hoitamaton hammas tai hammaskiven aiheuttama kipu
- Raskaus ja imetys (ilman lääkärin konsultaatiota)
- Alle 18-vuotiaat henkilöt

VAROTOIMET
Käytettävä hammaslääkärin valvonnassa.
Sisältää 16 % karbamidiperoksidia (vapauttaa noin 5,8 % vetyperoksidia).
Sisältää vetyperoksidia.
Sisältää natriumfluoridia.
Valmiste on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan hammaslääkäreille. Jokaisella käyttöjaksolla ensimmäinen käyttö on suoritettava hammaslääkärin toimesta tai hänen välittömässä valvonnassaan, jos vastaava turvallisuustaso voidaan varmistaa. Tämän jälkeen tuote voidaan luovuttaa kuluttajalle käyttöjaksojen loppuun saattamiseksi.
Vältä koskettusta silmiin. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.
Vältä kosketusta ikenin ja pehmytkudoksiin. Kun valmistetta sisältävä kisko on asetettu paikalleen, poista liika geeli ikenistä.
Älä niele tuotetta.
Lopeta käyttö, jos ilmenee kipua, ärsytystä tai yliherkkyyttä.
Tuote voidaan luovuttaa ainoastaan hampaan tunnollisia kuoloksia. Se ei muuta komposiittitäytteiden, kruunujen, laminaattien tai muiden proteettisten restauraatioiden väriä.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
- Hampaiden vilkkuminen ja herkkyys
- Ikenien ärsytys
- Ohimenevä epämukavuus

SÄILYTYS
Säilytä 2-25 °C:n lämpötilassa.
Suojattava valolta.
Ei saa jäätyä.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN KÄSITTELY
Käytetyt pakkaukset on toimitettava hävittäviltäsi tai palauttetava valmistajalle.

Viimeisen päivityksen päivämäärä: 11.08.2026/1

HR Profesionalni gel za izbjeljivanje zubi

Sadrži 16% urea peroksida (oslobađa oko 5,8% vodikovog peroksida).
Sadrži kalijev nitrat i natrijev fluorid.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
SASTAVCI: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
SASTAVCI: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
SASTAVCI: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
SASTAVCI: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

NAMJENA
Gel za izbjeljivanje zubi u obliku preparata koji sadrži 16% urea peroksida namijenjen je za prekrivanje zubi u stomatološkoj ordinaciji. Gel se može dati bolesniku za daljnju kućnu uporabu prema uputama stomatologa. Ovaj proizvod se koristi za smanjenje promjene boje zubi, kako vanjskih tako i unutarnjih, uključujući promjenu boje uslijed starenja. Proizvod je namijenjen za uporabu u odraslih bolesnika s prirodnim zubima.

NAČIN UPORABE
Način primjene: pojedinačni ili univerzalni termoskupljajući jastučići.
Potrebno je ukloniti zubni kamenac i obojenja na vidljivim zubima. Ako dođe do ozljede tkiva, prikazite jedan do dva tjedna prije početka izbjeljivanja kako biste smanjili rizik od preosjetljivosti desni.
Jednokratna primjena: 4-6 sati jednom dnevno prema uputama stomatologa.
1. Temeljito očistite zube prije nanošenja.
2. Skinite zaštitni poklopac s gela za izbjeljivanje.
3. Nanesite malu kapljicu gela na svaku komoru koja koji odgovara zubnoj koje treba izbijeliti.
4. Količina gela za zube treba se odabrati kako bi se osigurala nanošenje male kap pripravka koja odgovara svakom zubu. Nakon nanošenja, čvrsto zatvorite štrcaljku. Jedna štrcaljka, koja sadrži 1,2 ml proizvoda, dovoljna je za gornju i donju čeljust.
5. Za svaku čeljust treba upotrijebiti oko 1/3 do 1/2 sadržaja štrcaljke, što je količina dovoljna za premaz u svakoj od tih čeljusti.
6. Postavite udlagu na zube tako da gel dobro prianja uz površinu zuba.
7. Višak gela uklonite sa desni i sluzokože uz pomoć papirnate maramice ili suve, meke četkice za zube.
8. Nakon završetka postupka skinite udlagu, a zatim udlagu i usnu duplju temeljito isperite toplom vodom.
9. Operite zube.
Primjenjuj jednom dnevno, osim ako stomatolog ne preporuči drugačije. Ne prekoračuj preporučeno vrijeme primjene ni količinu pripravka.
U slučaju pojave blage preosjetljivosti skratiti vrijeme primjene ili napraviti pauzu u primjeni gela od jednog do dva dana.
U slučaju trajne nelagodnosti ili iritacije desni prekinuti primjenu i obratiti se stomatologu.
Preporučeno trajanje tretmana približno 10 dana ili do postizanja željenog efekta izbjeljivanja, u skladu sa preporukama stomatologa.
ZA POSTIZANJE EFIKASNIH REZULTATA:
Tokom postupka se ne smije jesti, piti ni pušiti.
Treba pušiti neposredno nakon postupka – potrebno je sačekati najmanje dva sata.
Najmanje 48 sati nakon postupka treba izbjegavati intenzivno obojene hranu i napitke.

Nakon završetka izbjeljivanja potrebno je sačekati 7–10 dana pre odabira boje i izrade adhezivnih nadoknada od kompozitnih materijala. Stabilizacija boje zahtijeva vrijeme, a ostaci peroksidnih jona mogu smanjiti jačinu vezivanja. Ovo je naročito važno prije izrade konačnih nadoknada u boji zuba.
U retkim slučajevima zubi ne reaguju na izbjeljivanje. Također se može dogoditi da se prvobitna boja zuba vrati ubrzo nakon završetka tretmana.

KONTRAINDIKACIJE
Ne primjenjuj u slučaju:
- Alergije ili preosjetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda
- Bolesti desni ili zapaljenjskih stanja usne šupljine
- Neliječenog karijesa ili oštećene zubne gleđi
- Tudinskih (dotrajalih) ispuna ili ukrasnog nakita (npr. krunica)
- Kod osoba mlađih od 18 godina

MJERE PREDOSTROŽNOSTI
Za primjenu pod nadzorom stomatologa.
Sadrži 16% karbamid-peroksida (koji oslobađa oko 5,8% vodikovog peroksida).
Sadrži vodiknik peroksid.
Sadrži natrijum-fluorid.
Proizvod je namijenjen za prodaju isključivo stomatolozima. U svakom ciklusu primene prvu primenu mora obaviti stomatolog ili se ona mora sprovesti pod njegovim neposrednim nadzorom, ukoliko je obezbeđen jednak nivo bezbednosti. Nakon toga proizvod se može predati potrošaču radi završetka ciklusa primene.
Izbegavati kontakt sa očima U slučaju kontakta sa očima odmah isprati velikom količinom vode.
Izbegavati kontakt sa desnima i mekim tkivima. Nakon postavljanja udlage sa preparatom ukloniti višak gela sa desni.
Ne gutati proizvod.
Prekinuti primenu u slučaju pojave bola, iritacije ili preosetljivosti.
Proizvod izbjeljuje isključivo prirodna zubna tkiva. Ne menja boju kompozitnih ispuna, krunica, faseta ni drugih protetskih nadoknada.

MOGUĆE NUSPOJAVE
- Preosetljivost zuba
- Iritacija desni
- Privremena nelagodnost

ČUVANJE
Čuvati na temperaturi od 2 do 25 °C.
Zaštititi od svetlosti.
Ne zamrzavati.
Držite proizvod van domašaja dece.

POSTUPAK SA AMBALAŽOM PROIZVODA
Iskorišćena ambalaža se mora odnositi ili vratiti proizvođaču.

Datum zadnjeg ažuriranja: 11.08.2026/1

NO Profesjonell gel for tannbleking

Inneholder 16% urea-hydrogenperoksyd (som frigjør ca. 5,8% hydrogenperoksid).
Inneholder kaliumnitrat og natriumfluorid.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENSER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENSER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENSER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENSER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

NAMNEN UPORABE
Ta gel za beljenje zob, ki vsebuje 16 % karbamid peroksida, je namenjen beljenju zob v ordinaciji. Izdelek se lahko pacientu da za nadaljnjo uporabo doma, kot navaja navodila stomatologa. Ta izdelek se uporablja za zmanjšanje obarvanja zob, tako zunanjega kot notranjega, vključno s starostnim razbarvanjem. Izdelek je namenjen uporabi pri odraslih pacientih z naravnimi zobmi.

UPORABA
Način uporabe: individualne ali univerzalne toplotno skrčljive obloge.
Zobni kamen in zunanje madeže je treba odstraniti. Če je prišlo do poškodbe tkiva, počakajte en do dva tedna pred beljenjem, da zmanjšate tveganje za občutljivost desni.
Čas ene aplikacije: 4 do 6 ur enkrat na dan, po priporočilu zobozdravnika.
1. Pred nanosom temeljito očistite zobe.
2. Odstranite pokrovček z brizge z belilnim gelom.
3. V vsako komoro plodila za nadeno majhno kapljico gela, ki ustreza zobem, ki jih želite pobeliti.
4. Količino gela je treba prilagoditi tako, da se majhna kapljica izdelka nanese v vsako komoro plodnja. Ki ustreza zobem, ki jih želite pobeliti. Po nanosu brizgo previdno zaprite. Ena brizga, ki vsebuje 1,2 ml izdelka, zadostuje za približno dva do tri nanose. Za vsak nanos je treba uporabiti približno 1/3–1/2 vsebine brizge, kar zadostuje tako za zgornji kot spodnji plodenj.
5. Pladenj namestite čez zobe, da se gel popolnoma oprime površine zoba.
6. Odvečni gel z desni in ustne sluznice odstranite s papirnatim robčkom ali suho, mehko ščetko.
7. Po končanem zdravljenju odstranite pladenj in nato s toplo vodo temeljito speite obliž ter usta z ustnim vodo.
8. Umij si zobe.
Uporabljajte enkrat na dan, razen če vam zobozdravnik ne naroči drugače. Ne prekoračite priporočenega trajanja ali količine.
Če se pojavi blaga preobčutljivost, skrajšajte čas nanosa ali pa si vzemite odmor od uporabe gela (1–2 dni).
Če nelagodje ali draženje ne prenehata, prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zobozdravnikom.
Priporočen čas zdravljenja približno 10 dni oziroma dokler ni dosežen želeni učinek beljenja, kot vam priporoči vaš zobozdravnik.
ZA DOSEŽEK UČINKOVITIH REZULTATOV:
Med postopkom ne smete jesti, piti ali kaditi.
Takoj po posegu ne kadite – počakajte vsaj dve uri.
Po posegu se morate vsaj 48 ur izogibati močno obarvani živilom in pijačam.

Po beljenju počakajte 7–10 dni, preden se lotite izdelovanja barve in namestitve adhezivnih kompozitnih restavracij. Stabilizacija barve traja nekaj časa, preostali peroksidni ioni pa lahko zmanjšajo trdnost vezi. To je še posebej pomembno pred namestitvijo končnih restavracij v barvi zoba.
V redkih primerih se zobje ne odzovejo na beljenje. Možno je tudi, da se zobje kmalu po koncu zdravljenja vrnejo v prvotno barvo.

KONTRAINDIKACIJE
Ne uporabljajte v primeru:
- Alergija ali preobčutljivost na katero koli sestavino izdelka
- Bolezen dlesni ali vnetje ustne votline
- Nezdravljenega karies ali poškodovanega zobnega tkiva
- Nosečnost in dojenje (brez posveta z zdravnikom)
- Za osebe, mlajše od 18 let

PREVIDNOSTNI UKREPI
Uporabljati pod nadzorom zobozdravnika.
Vsebuje 16 % karbamid peroksida (sproža približno 5,8 % vodikovega peroksida).
Vsebuje vodikov peroksid.
Vsebuje natrijev fluorid.
Ta izdelek je namenjen izključno za prodajo zobozdravnikom. Vsak cikel uporabe mora prvo uporabo opraviti zobozdravnik ali pa se ta izvede pod njegovim neposrednim nadzorom, če je zagotovljena enakovredna raven varnosti. Izdelek se nato lahko preda potrošniku za dokončanje cikla uporabe.
Izogibajte se stiku z očmi. V primeru stika z očmi, jih takoj speite z veliko vode.
Izogibajte se stiku z dlesnimi in mehkimi tkivi. Po nanosu gela odstranite odvečni gel z dlesni.
Izdelka ne pogoltnite.
Prenehajte z uporabo, če se pojavi bolečina, draženje ali preobčutljivost.
Ta izdelek beli samo naravno zobno tkivo. Ne spremeni barve kompozitnih zalivk, kron, furnirjev ali drugih protetičnih nadomestkov.

MOŽNI NEZELENI UČINKI
- Preobčutljivost zob
- Draženje dlesni
- Začasno nelagodje

SKLADIŠČENJE
Shranjujte pri temperaturi od 2 do 25 °C.
Zaščitite pred svetlobo.
Ne zamrzujte.
Hraniti izven dosega otrok.

RAVNANJE Z EMBALAŽO IZDELKOV
Rabljeno embalažo je treba reciklirati ali vrniti proizvajalcu.

Datum zadnje posodobitve: 11.08.2026/1

SV Ett professionellt tandblekningsgel

Innehåller 16 % urea-peroxid (som frigör ca 5,8 % väteperoxid).
Innehåller kaliumnitrat och natriumfluorid.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIENSER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIENSER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIENSER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIENSER: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

ÄNDAMÅL
Tandblekningsgel i form av ett preparat som innehåller 16 % urea-peroxid är avsett för tandblekning med skenor på tandläkarkliniken. Produkten kan överlämnas till patienten för fortsatt användning i hemmet i enlighet med tandläkarens anvisningar. Produkten används för att minska risken för missfärgning av tänderna, både yttre och inre, inklusive åldersrelaterade missfärgningar. Produkten är avsedd för användning hos vuxna patienter med naturliga tänder.

ANVÄNDNING
Användningssätt: individuella eller universella värmekrympbara folier.
Tandsten och ytliga missfärgningar bör avlägsnas. Om vävnaden har skadat sig bör man vänta en till två veckor innan man påbörjar blekningen för att minska risken för överkänslighet i tandköttet.
Tiden för en applikation: 4–6 timmar, en gång om dagen, enligt tandläkarens anvisningar.
1. Rengör tänderna noggrant innan du använder dem.
2. Ta av locket från sprutan med blekgelen.
3. Applicera en liten droppe gel i munskyddets varje fack som motsvarar de tänder som ska blekas.
4. Mängden gel ska anpassas så att en liten droppe av preparatet appliceras i varje fack som munskyddet som motsvarar de tänder som ska blekas. Stäng sprutan ordentligt efter användning. En spruta, som innehåller 1,2 ml av produkten, räcker till cirka två till tre behandlingar. Per applicering ska man använda cirka 1/3–1/2 av sprutans innehåll, vilket är en mängd som räcker till både övre och det undre laget.
5. Sätt på tandskenan så att gelen fäster ordentligt mot tänderna.
6. Ta bort överflödigt gel från tandköttet och slemhinnan i munhålan med en nästuk eller en torr, mjuk tandborste.
7. När behandlingen är avslutad ska du ta av munskyddet och sedan skölja både munskyddet och munhålan noggrant med ljummet vatten.
8. Borsta tänderna.
Använd en gång om dagen, såvida inte tandläkaren rekommenderar något annat. Överskrid inte den rekommenderade användningstiden eller -mängden.
Vid mild överkänslighet bör du förkorta appliceringstiden eller ta en paus i användningen av gelén (1–2 dagar).
Om obehag eller irritation kvarstår – avbryt användningen och kontakta din tandläkare.
Rekommenderad behandlingstid: cirka 10 dagar eller tills önskad blekningseffekt uppnås, enligt tandläkarens anvisningar.
FÖR ATT UPPNÅ EFFEKTIVA RESULTAT:
Man bör inte äta, dricka eller röka under behandlingen.
Man bör inte röka direkt efter ingrepp – man bör vänta minst två timmar.
Under minst 48 timmar efter ingrepp bör man undvika mat och dryck med starka färger.

Efter avslutad tandblekning bör man vänta 7–10 dagar innan man väljer färg och utför adhesiva restaureringar med kompositmaterial. Det tar tid för färgen att stabiliseras, och rester av peroxidjoner kan minska bindningsstyrkan. Detta är särskilt viktigt innan de slutliga tandfärgade restaureringarna sätts in.
I sällsynta fall reagerar tänderna ej på tandblekning. Det händer också att tändernas ursprungliga färg återkommer kort efter att medicinsk behandling avslutats.

KONTRAINDIKATIONER
Får ej användas i följande fall:
- Allergi eller överkänslighet mot någon av produktens beståndsdelar
- Tandköttssjukdomar eller inflammationer i munhålan
- Obehandlad karies eller skadat emalj
- Graviditet och amning (utan samråd med läkare)
- För personer under 18 år

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Ska användas under tandläkares uppsikt.
Innehåller 16 % urea-peroxid (som frigör cirka 5,8 % väteperoxid).
Innehåller väteperoxid.
Innehåller natriumfluorid.
Produkten är avsedd att säljas enbart till tandläkare. Vid varje behandlingscykel måste den första användningen utföras av en tandläkare eller under dennes direkta övervakning, förutsatt att en likvärdig säkerhetsnivå garanteras. Därefter kan produkten överlämnas till konsumenten för att avsluta användningscykeln.
Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten.
Undvik kontakt med tandkött och mjukvävnaden. När du har applicerat pålägget med preparatet ska du ta bort överskottet av gel från tandköttet.
Produkten får inte sväljas.
Avbryt användningen om smärta, irritation eller överkänslighet uppstår.
Produkten bleker endast tandens naturliga vävnad. Det påverkar inte färgen på kompositfyllningar, kronor, fasader eller andra protetiska restaureringar.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR
- Överkänslighet i tänderna
- Irritation i tandköttet
- Tillfälligt obehag

FÖRVARING
Förvaras vid 2-25°C.
Förvaras skyddat från ljus.
Får ej frysas.
Förvaras utom räckhåll för barn.

HANTERING AV PRODUKTFÖRPACKNINGAR
Förbrukade förpackningar lämnas för återvinning eller tillbaka till tillverkaren.

Senaste uppdatering: 11.08.2026/1

SR Profesionalni gel za izbeljivanje zuba

Sadrži 16% karbamid-peroksida (koji oslobađa oko 5,8% vodonik-peroksida).
Sadrži kalijum-nitrat i natrijum-fluorid.

LUMINESCENCE WHITE Neutral
INGREDIJENTI: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Melon
INGREDIJENTI: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Mint
INGREDIJENTI: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.
LUMINESCENCE WHITE Strawberry
INGREDIJENTI: Glycerin, Aqua, Urea Peroxide, Carbomer, Xylitol, PEG-6, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Fluoride, Aroma, Disodium EDTA.

NA